

# SÉRIES À TERMES POSITIFS ET INÉGALITÉS

Dominique Hoareau, domeh@wanadoo.fr

Références :

- Exercices avec corrigés et commentaires sur le cours, Analyse, P. Meunier, Puf
- Les cahiers de la RMS5, Vuibert supérieur

## 1 Quelques outils

### 1.1 L'inégalité arithmético-géométrique (I.A.G)

#### Propriété 1

Soit  $u_1, u_2, \dots, u_n$   $n$  réels strictement positifs. Alors :

$$(u_1 u_2 \dots u_n)^{\frac{1}{n}} \leq \frac{u_1 + \dots + u_n}{n}.$$

*Preuve* (de Ehlers) : On se persuade qu'il suffit de montrer :

$$\mathcal{P}_n : [u_1, \dots, u_n > 0 \quad ; \quad u_1 \dots u_n = 1] \Rightarrow u_1 + \dots + u_n \geq n,$$

et on procède par récurrence sur  $n$ . Pour  $n = 1$ , le résultat est trivial. On suppose la propriété vraie au rang  $n$ . Soit  $u_1, \dots, u_{n+1}$  strictement positifs tels que  $u_1 \dots u_{n+1} = 1$ . Quitte à renuméroter, on peut supposer  $u_1 \geq 1$  et  $u_2 \leq 1$ . Avec  $(u_1 - 1)(u_2 - 1) \leq 0$ , on a :  $u_1 u_2 + 1 \leq u_1 + u_2$ . On applique alors  $\mathcal{P}_n$  aux réels  $u'_1 = u_1 u_2, u'_2 = u_3, \dots, u'_n = u_{n+1}$  ;  $u_1 u_2 + u_3 + \dots + u_{n+1} \geq n$ , donc

$$u_1 + u_2 + u_3 + \dots + u_{n+1} \geq u_1 u_2 + 1 + u_3 + \dots + u_{n+1} \geq n + 1.$$

*Remarque* : L'I.A.G appliquée aux réels strictement positifs  $\frac{1}{u_1}, \dots, \frac{1}{u_n}$  donne :  $0 < \frac{1}{(u_1 \dots u_n)^{\frac{1}{n}}} \leq \frac{\frac{1}{u_1} + \dots + \frac{1}{u_n}}{n}$  et permet de comparer les moyennes géométrique et harmonique :

$$\frac{n}{\frac{1}{u_1} + \dots + \frac{1}{u_n}} \leq (u_1 \dots u_n)^{\frac{1}{n}}.$$

### 1.2 Le lemme de Césaro

#### Propriété 2

(1) On considère une suite  $(a_n)$  de réels strictement positifs. Alors les deux énoncés suivants sont équivalents :

1. La série à termes positifs  $\sum a_n$  diverge, c-à-d  $A_n = a_1 + \dots + a_n$  tend vers  $+\infty$ .
2. Pour toute suite réelle  $(u_n)$  admettant une limite  $L$  (finie ou non) dans  $\overline{\mathbb{R}}$ , la suite  $\left(\frac{a_1 u_1 + \dots + a_n u_n}{a_1 + \dots + a_n}\right)$  tend aussi vers  $L$ .

(2) *Lemme de l'escalier* : Si une suite de réels  $(u_n)$  vérifie :  $u_{n+1} - u_n \rightarrow l \in \overline{\mathbb{R}}$ , alors  $\left(\frac{u_n}{n}\right)$  tend aussi vers  $l$ .

(1  $\Rightarrow$  2) : Si la suite  $(u_n)$  converge vers  $L \in \mathbb{R}$ , pour  $\varepsilon > 0$ , on choisit  $N \in \mathbb{N}$  tel que :  $\forall n > N \quad |u_n - L| \leq \varepsilon$ .

Pour  $n > N$ , on pose :  $\Delta_n = \left| \frac{a_1 u_1 + \dots + a_n u_n}{a_1 + \dots + a_n} - L \right| = \left| \frac{a_1(u_1 - L) + \dots + a_n(u_n - L)}{a_1 + \dots + a_n} \right|$ . On a :

$$\Delta_n \leq \underbrace{\frac{1}{a_1 + \dots + a_n} \sum_{k=1}^N |a_k(u_k - L)|}_K + \underbrace{\frac{1}{a_1 + \dots + a_n} \sum_{k=N+1}^n a_k |u_k - L|}_{\leq \frac{a_{N+1} + \dots + a_n}{a_1 + \dots + a_n} \varepsilon \leq \varepsilon}.$$

Puisque  $(A_n = a_1 + \dots + a_n)$  tend vers  $+\infty$ , on choisit à bon droit  $N_1 > N$  tel que :  $\forall n > N_1 \quad \frac{K}{a_1 + \dots + a_n} \leq \varepsilon$ .  
 Pour  $n > N_1$ , clairement :  $\Delta_n \leq 2\varepsilon$ .

On suppose à présent :  $L = +\infty$ . Pour  $A > 0$ , on choisit  $N \in \mathbb{N}$  tel que :  $\forall n > N \quad u_n \geq A$ .

On a :  $\frac{a_1 u_1 + \dots + a_n u_n}{a_1 + \dots + a_n} \geq \frac{\sum_{k=1}^N a_k u_k}{a_1 + \dots + a_n} + \frac{a_{N+1} + \dots + a_n}{a_1 + \dots + a_n} A$ . La suite  $(A_n)$  tend vers  $+\infty$  donc

- Avec  $\frac{a_{N+1} + \dots + a_n}{a_1 + \dots + a_n} = 1 - \frac{a_1 + \dots + a_N}{a_1 + \dots + a_n}$ , on choisit  $N_1 > N$  tel que :  $n > N_1 \Rightarrow \frac{a_{N+1} + \dots + a_n}{a_1 + \dots + a_n} \geq \frac{1}{2}$ .

- On choisit  $N_2 > N_1$  tel que  $\forall n > N_2 \quad \frac{\sum_{k=1}^N a_k u_k}{a_1 + \dots + a_n} \geq -\frac{A}{4}$ .

Bilan :  $\frac{a_1 u_1 + \dots + a_n u_n}{a_1 + \dots + a_n} \geq \frac{A}{4}$  dès que  $n > N_2$ .

$(2 \Rightarrow 1)$  :  $(A_n)$  est croissante donc admet une limite  $l \in \overline{\mathbb{R}}$ . Si  $l \in \mathbb{R}$ ,  $l \neq 0$  puisque  $A_1 = a_1 > 0$  et  $(A_n)$  croît.  
 En considérant la suite  $u_1 = 1$ ,  $u_n = 0$  pour  $n \geq 2$ ,  $(\frac{1}{a_1 + \dots + a_n})$  converge aussi vers 0 d'après (2), ce qui donne par unicité de la limite  $0 = \frac{1}{l}$ . Impossible.

### Application 1

$$H_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} \sim \ln n$$

On veut définir deux suites  $(a_n)$  et  $(u_n)$  telles que :

$$a_1 + \dots + a_n = \ln n, \quad a_n u_n = \frac{1}{n}, \quad u_n \rightarrow 1.$$

On considère la suite  $a_1 = 0$ ,  $a_n = \ln n - \ln(n-1) = \ln(\frac{n}{n-1})$ . Pour  $n \geq 1$ , on pose :  $u_n = \frac{1}{n \ln(\frac{n}{n-1})}$  et on vérifie que ça marche...

*Exercice* : Montrer que la série  $\sum \frac{1}{H_n}$  ne vérifie pas le critère de Cauchy et retrouver la divergence de la série de Bertrand  $\sum \frac{1}{n \ln n}$ .

Par l'absurde, on choisit  $N_0 \in \mathbb{N}$  tel que :

$$\forall N \geq N_0 \quad \forall p \in \mathbb{N} \quad \sum_{n=N}^{N+p} \frac{1}{H_n} < \frac{1}{2} \quad (*).$$

Or, pour  $p \in \mathbb{N}$  :

$$\sum_{n=N_0}^{N_0+p} \frac{1}{H_n} = \sum_{n=N_0}^{N_0+p} \frac{H_n - H_{n-1}}{H_n} \geq \frac{1}{H_{N_0+p}} \sum_{n=N_0}^{N_0+p} H_n - H_{n-1} = \frac{H_{N_0+p} - H_{N_0-1}}{H_{N_0+p}} = 1 - \frac{H_{N_0-1}}{H_{N_0+p}}.$$

Puisque  $(H_n)$  diverge vers  $+\infty$ , on choisit à bon droit  $p \in \mathbb{N}$  tel que  $\frac{H_{N_0-1}}{H_{N_0+p}} \leq \frac{1}{2}$ . L'inégalité  $\sum_{n=N_0}^{N_0+p} \frac{1}{H_n} \geq \frac{1}{2}$  contredit alors (\*). Enfin,  $\frac{1}{H_n} \sim \frac{1}{n \ln n} \geq 0$ , donc par équivalents,  $\sum \frac{1}{n \ln n}$  diverge.

*Remarque* : On montre de la même façon : Pour une série à termes strictement positifs  $\sum u_n$  qui diverge, la série  $\sum \frac{u_n}{U_n}$  diverge aussi, et ce malgré la décroissance de  $(\frac{1}{U_n})$  vers 0.

### Application 2

"D'Alembert" implique "Cauchy" : Si  $l$  est un réel de  $\mathbb{R}^{*+}$  et si une suite de réels strictement positifs  $(u_n)$  vérifie :  $\frac{u_{n+1}}{u_n} \rightarrow l$  (condition de D'Alembert), alors la suite  $(u_n^{\frac{1}{n}})$  converge vers  $l$ . (condition de Cauchy)

Par continuité de la fonction  $\ln$ , la suite  $(\ln(u_{n+1}) - \ln(u_n))$  tend vers  $\ln l$ , donc par Césaro ou le lemme de l'escalier,  $(\frac{1}{n} \sum_{k=0}^n \ln(u_k) - \ln(u_{k-1}))$  et  $(\frac{1}{n} \ln(u_n))$  convergent vers  $\ln l$ . Par continuité de la fonction exponentielle,  $(u_n^{\frac{1}{n}})$  converge vers  $l$ .

*Exemple* Pour  $n > 0$ , on pose :  $s_n = \frac{n!}{n^n}$ . On a :  $\frac{s_{n+1}}{s_n} = \left(\frac{n}{n+1}\right)^n = (1 - \frac{1}{n})^n$  donc  $(\frac{s_{n+1}}{s_n})$  tend vers  $e^{-1}$ . De là :  $(s_n)^{\frac{1}{n}} \rightarrow e^{-1}$ , c-à-d :

$$(n!)^{\frac{1}{n}} \sim \frac{n}{e}.$$

### 1.3 Transformation d'Abel avec reste, une première illustration

#### Propriété 3

Soit  $(u_n)$  une suite de réels positifs. Si la série  $\sum \frac{1}{n} u_n$  converge, alors

- La suite  $(u_n)$  converge en moyenne vers 0. La réciproque est fautive ; Considérer par exemple le terme général  $(u_n = \frac{1}{\ln n})$ , qui converge et donc converge en moyenne vers 0. Pourtant, la série  $\sum \frac{1}{n} u_n$  est une série de Bertrand divergente.
- La série  $\sum u_1 \dots u_n$  converge.

Pour  $n \geq 0$ , on pose :  $R_n = \sum_{k \geq n+1} \frac{u_k}{k}$ . Pour  $n \geq 1$ , on a :

$$\frac{U_n}{n} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n k(R_{k-1} - R_k) = \frac{1}{n} \left[ \sum_{k=0}^{n-1} R_k - n R_n \right] = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} R_k - R_n.$$

Or  $(R_n)$  tend vers 0 et, par Césaro,  $(\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} R_k)$  converge aussi vers 0. D'où le résultat.

Malgré les simplifications massives dans :  $\frac{u_1 \dots u_{n+1}}{u_1 \dots u_n} = u_{n+1}$  ( $n \geq 1$ ), la règle de D'Alembert semble inutilisable. En revanche, avec l'I.A.G et la convergence en moyenne de  $(u_n)$  vers 0, la règle de Cauchy assure la convergence de  $\sum u_1 \dots u_n$ .

## 2 Position des problèmes

Soit  $(u_n)$  une suite de réels positifs non tous nuls. Pour  $n \geq 1$ , on pose :

$$U_n = u_1 + \dots + u_n \quad ; \quad v_n = \frac{U_n}{n} = \frac{u_1 + \dots + u_n}{n}.$$

Si  $(u_n)$  tend vers 0, par le lemme de Césaro,  $(v_n)$  tend aussi vers 0, mais moralement moins rapidement que  $(u_n)$ . Par exemple, si  $u_n = \frac{1}{n}$ , on a :  $v_n = \frac{1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}}{n} \sim \frac{\ln n}{n}$ . Aussi, lorsque  $\sum u_n$  converge de somme  $U > 0$ ,  $\sum v_n$  diverge puisque le terme général positif  $v_n = \frac{U_n}{n}$  est équivalent à  $\frac{U}{n}$ .

1. En revanche, toujours par équivalents, la série à termes positifs  $\sum v_n^2$  converge dès que  $\sum u_n$  converge. On a mieux :

#### Propriété 4

*Inégalité de Hardy* : Si  $\sum u_n^2$  converge, alors  $\sum v_n^2$  converge aussi, et  $\sum_{n=1}^{\infty} v_n^2 \leq 4 \sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ .

2. On suppose toujours  $\sum u_n$  convergente. On remplace le terme général  $v_n$  (moyenne arithmétique de  $u_1, \dots, u_n$ ) par  $w_n = (u_1 \dots u_n)^{\frac{1}{n}}$  et on s'intéresse à la nature de  $\sum w_n$ . On gagne en "petitesse" du terme général :  $0 \leq w_n \leq v_n$  par application brutale de l'inégalité arithmético-géométrique, mais le théorème de comparaison pour séries à termes positifs est inopérant puisque la série majorante  $\sum v_n$

diverge. Autre "coup d'épée dans l'eau" : Avec  $0 \leq \frac{u_n}{n} \leq u_n$ , la série  $\sum \frac{u_n}{n}$  converge, donc  $\sum u_1 \dots u_n$  converge aussi (cf supra), donc  $(u_1 \dots u_n)$  tend vers 0. À partir d'un certain rang,  $0 \leq u_1 \dots u_n \leq 1$  donc  $0 \leq u_1 \dots u_n \leq (u_1 \dots u_n)^{\frac{1}{n}}$ . Cela se révèle encore insuffisant puisque la série minorante converge.

#### Propriété 5

*Inégalité de Carleman : Si  $\sum u_n$  est une série à termes strictement positifs convergente, alors la série  $\sum (u_1 \dots u_n)^{\frac{1}{n}}$  converge et  $\sum_{n=1}^{\infty} (u_1 \dots u_n)^{\frac{1}{n}} \leq e \times \sum_{n=1}^{\infty} u_n$ .*

### 3 Preuves de l'inégalité de Hardy

Rappel des notations : Pour  $n \geq 1$ ,

$$U_n = u_1 + \dots + u_n \quad ; \quad v_n = \frac{U_n}{n} = \frac{u_1 + \dots + u_n}{n}.$$

Pour  $N \geq 2$ ,  $\sum_{n=1}^N v_n^2 = \sum_{n=1}^N \frac{U_n^2}{n^2} = \sum_{n=1}^N (\rho_{n-1} - \rho_n) U_n^2$  où  $\rho_n = \sum_{k \geq n+1} \frac{1}{k^2}$ . Il vient :

$$\sum_{n=1}^N v_n^2 = \rho_0 U_1^2 - \rho_N U_N^2 + \sum_{n=1}^{N-1} \rho_n (U_{n+1}^2 - U_n^2) \leq \rho_0 U_1^2 + \sum_{n=1}^{N-1} \rho_n u_{n+1} (U_{n+1} + U_n) \leq \underbrace{\rho_0 U_1^2}_{= \frac{\pi^2}{6} u_1 v_1} + \sum_{n=1}^{N-1} 2 \rho_n u_{n+1} U_{n+1}.$$

Or :  $\rho_n = \sum_{k \geq n+1} \frac{1}{k^2} \leq \int_n^{\infty} \frac{dt}{t^2} = \frac{1}{n} \leq \frac{2}{n+1}$ , d'où :

$$\sum_{n=1}^N v_n^2 \leq \frac{\pi^2}{6} u_1 v_1 + 4 \sum_{n=1}^{N-1} u_{n+1} v_{n+1} \leq 4 \sum_{n=1}^N u_n v_n$$

et avec Cauchy-Schwarz :

$$\left( \sum_{n=1}^N v_n^2 \right)^{\frac{1}{2}} \leq 4 \left( \sum_{n=1}^N u_n^2 \right)^{\frac{1}{2}},$$

d'où la convergence de  $\sum v_n^2$  et l'inégalité :  $\sum_{n=1}^{\infty} v_n^2 \leq 16 \sum_{n=1}^{\infty} v_n^2$ .

*Commentaire* : Quand on étudie la nature d'une série à termes positifs (STP), on a recours en général aux critères de convergence relatifs aux STP, qui relèvent du théorème de la limite monotone. Voici un exemple (rare) où la majoration des sommes partielles d'une STP se fait grâce à une transformation d'Abel.

*Autre preuve* : Pour  $N \in \mathbb{N}^*$ , on majore la quantité  $\sum_{n=1}^N u_n v_n$  grâce à Cauchy-Schwarz, et on la minore en écrivant pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$  :  $u_n = U_n - U_{n-1} = n v_n - (n-1) v_{n-1}$ . On a d'abord :

$$\left( \sum_{n=1}^N u_n v_n \right)^2 \leq \sum_{n=1}^N u_n^2 \sum_{n=1}^N v_n^2.$$

Pour  $n \geq 1$ ,  $u_n v_n \geq n v_n^2 - (n-1) v_{n-1} v_n \geq n v_n^2 - \frac{n-1}{2} (v_n^2 + v_{n-1}^2)$  donc  $u_n v_n \geq \frac{n+1}{2} v_n^2 - \frac{n-1}{2} v_{n-1}^2$ . Il vient :  $\sum_{n=1}^N u_n v_n \geq v_1^2 + (\frac{3}{2} v_2^2 - \frac{1}{2} v_1^2) + (2 v_3^2 - v_2^2) + \dots + (\frac{N+1}{2} v_N^2 - \frac{N-1}{2} v_{N-1}^2) = \frac{N+1}{2} v_N^2 + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{N-1} v_n^2 \geq \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{N-1} v_n^2$ . Ainsi :

$$\sum_{n=1}^N u_n^2 \sum_{n=1}^N v_n^2 \geq \left( \sum_{n=1}^N u_n v_n \right)^2 \geq \frac{1}{4} \left( \sum_{n=1}^N v_n^2 \right)^2,$$

et en définitive :

$$4 \sum_{n=1}^{\infty} u_n^2 \geq 4 \sum_{n=1}^N u_n^2 \geq \sum_{n=1}^N v_n^2.$$

La suite  $(v_n^2)$  est à sommes partielles positives et bornées, donc  $\sum v_n$  converge et  $4 \sum_{n=1}^{\infty} u_n^2 \geq \sum_{n=1}^{\infty} v_n^2$ .

## 4 Preuve de l'inégalité de Carleman

### 4.1 Préliminaire

#### Propriété 6

Si  $\sum u_n$  est une série convergente, alors la série de terme général

$$a_n = \frac{1}{n(n+1)} \underbrace{[u_1 + 2u_2 + \dots + nu_n]}_{\frac{n(n+1)}{2} \text{ termes}}$$

converge et sa somme vaut :  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_1^{\infty} u_n$ .

Preuve : Pour  $n \geq 1$ , on pose :  $R_n = \sum_{k \geq n+1} u_k$ . Pour  $N \geq 1$ , on a :

$$\sum_{n=1}^N a_n = \sum_{n=1}^N \frac{1}{n(n+1)} [(R_0 - R_1) + 2(R_1 - R_2) + \dots + n(R_{n-1} - R_n)] = \sum_{n=1}^N \frac{1}{n(n+1)} \underbrace{[(R_0 + \dots + R_{n-1}) - nR_n]}_{\rho_n}$$

ce qui donne :  $\sum_{n=1}^N a_n = \sum_{n=1}^N (\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}) \rho_n - \sum_{n=1}^N \frac{R_n}{n+1} = \rho_1 - \frac{\rho_N}{N+1} + \sum_{n=2}^N \frac{1}{n} (\rho_n - \rho_{n-1}) - \sum_{n=1}^N \frac{R_n}{n+1}$ ,  
ou encore :  $\sum_{n=1}^N a_n = \rho_1 - \frac{\rho_N}{N+1} + \sum_{n=2}^N \frac{R_{n-1}}{n} - \sum_{n=1}^N \frac{R_n}{n+1} = \rho_1 - \frac{\rho_N}{N+1} - \frac{R_N}{N+1}$ . Lorsque  $N$  tend vers  $+\infty$ ,  $(\frac{R_N}{N+1})$  tend vers 0 et par Césaro,  $(\frac{\rho_N}{N+1})$  converge aussi vers 0. On a montré que  $\sum a_n$  converge et sa somme vaut :  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \rho_1 = R_0 = \sum_1^{\infty} u_n$ .

### 4.2 Retour preuve

L'astuce est d'utiliser l'I.A.G après avoir pondéré les  $u_k$  par des coefficients strictement positifs  $a_k$  (à choisir judicieusement par la suite) :

$$(u_1 a_1 \dots u_n a_n)^{\frac{1}{n}} \leq \frac{1}{n} (u_1 a_1 + \dots + u_n a_n) \quad (\star).$$

On cherche  $(a_k)$  de sorte que :  $\forall n \geq 1 \quad \prod_{k=1}^n a_k = (n+1)^n$ . On pose :  $a_k = \frac{(k+1)^k}{k^{k-1}} = k(1 + \frac{1}{k})^k$ . L'inégalité  $(\star)$  donne alors :  $w_n = (u_1 \dots u_n)^{\frac{1}{n}} \leq \frac{1}{n(n+1)} \sum_{k=1}^n (1 + \frac{1}{k})^k k u_k$ . Or on sait que :  $\forall k \geq 1 \quad (1 + \frac{1}{k})^k \leq e$ , donc :  $0 < w_n = (u_1 \dots u_n)^{\frac{1}{n}} \leq \frac{e}{n(n+1)} \sum_{k=1}^n k u_k$ . Par convergence de  $\sum (\frac{1}{n(n+1)} (u_1 + 2u_2 + \dots + nu_n))$  (de somme  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ ), la série à termes positifs  $\sum w_n$  converge et sa somme vérifie :  $\sum_{n=1}^{\infty} w_n \leq e \sum_{n=1}^{\infty} u_n$ .

## 5 Inégalité de Knopp

Avec l'inégalité de Carleman en poche et la comparaison entre moyenne géométrique et moyenne harmonique :

#### Propriété 7

Soit  $\sum u_n$  une série à termes strictement positifs convergente. Alors la série de terme général  $x_n = \frac{n}{\frac{1}{u_1} + \dots + \frac{1}{u_n}}$  converge et  $\sum_{n=1}^{\infty} x_n \leq e \sum_{n=1}^{\infty} u_n$ . On peut montrer que :

$$\sum_{n=1}^{\infty} x_n \leq 2 \sum_{n=1}^{\infty} u_n.$$

On souhaite s'affranchir de l'inégalité de Carleman pour prouver la convergence de  $\sum x_n$ . (cf cours de J.M Exbrayat pour l'agrégation, Université de Montpellier)

Par commodité, on pose pour  $n \in \mathbb{N}^*$  :

$$a_n = \frac{1}{u_n} \quad ; \quad A_n = a_1 + \dots + a_n.$$

Pour  $N \geq 1$ ,  $\sum_{n=1}^N x_n = \sum_{n=1}^N \frac{n}{A_n} \leq \sum_{n=1}^{2N} \frac{n}{A_n} = \sum_{n=1}^N \left( \frac{2n-1}{A_{2n-1}} + \frac{2n}{A_{2n}} \right)$ . On range  $a_1, \dots, a_{2N}$  dans l'ordre croissant en  $b_1, \dots, b_{2N}$ . Pour  $1 \leq n \leq N$ ,  $A_{2n} \geq A_{2n-1} \geq b_1 + \dots + b_{2n-1} \geq b_n + \dots + b_{2n-1} \geq nb_n$ . Ainsi,  $\frac{2n}{A_{2n}} \leq \frac{2}{b_n}$  et  $\frac{2n-1}{A_{2n-1}} \leq \frac{2n-1}{nb_n} \leq \frac{2}{b_n}$ . Il vient :  $\sum_{n=1}^N x_n = \sum_{n=1}^N \frac{n}{A_n} \leq \sum_{n=1}^N \left( \frac{2n-1}{A_{2n-1}} + \frac{2n}{A_{2n}} \right) \leq 4 \sum_{n=1}^N \frac{n}{b_n} \leq 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$ , d'où la convergence de  $\sum x_n$  et l'inégalité :  $\sum_{n=1}^{\infty} x_n \leq 4 \sum_{n=1}^{\infty} u_n$ .